



### دسته دارویی:

ترکیبات چهارتایی آمونیوم

### ترکیب:

۲۰۰ میلی لیتر بنزالکونولیم کلراید در هر لیتر از محلول

### مکانیسم اثر:

بنزالکونولیم کلراید با تاثیر بر دیواره سلولی باعث انعقاد سیتوپلاسم می گردد و از فعالیت بعضی از آنزیم های حیاتی میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند. یون کلر موجود در آن باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های DNA و RNA موجود در ویروس ها می شود.

### موارد مصرف:

- ضد عفونی تخم مرغ پیش از انتقال به هچری
- در کارخانه های جوجه کشی برای ضد عفونی هچری ها
- ضد عفونی سالن های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری
- ضد عفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و عبور دام در مزارع پرورش دام و طیور
- ضد عفونی حوضچه های ورودی سالن های مرغداری
- ضد عفونی جایگاه نگهداری دام ها، زایشگاه، گوساله دانی و بیمارستان
- مبارزه با بیماری های عفونی در مزارع پرورش ماهی
- ضد عفونی کامیون های حمل و نقل
- ضد عفونی کفپوش، چکمه ها و ...

### مقدار و روش مصرف:

- به نسبت ۱ به ۲۰۰ جهت ضد عفونی سالن ها و تجهیزات مرغداری، حوضچه های ورودی، وسایل حمل و نقل و ...

- به نسبت ۱ به ۱۰۰۰ برای ضد عفونی تخم مرغ و هچری

### موارد احتیاط:

- هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید.
- از تنفس بخارات و اسپری محصول پرهیز نمایید.
- آشامیدن محلول خطرناک است و در صورت تماس با پوست سوزاننده و ایجاد حساسیت می نماید.
- در صورت تماس با چشم ها، با آب شستشو و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمایید.
- به دور از منابع آب و غذای دام ها نگهداری شود.

### بسته بندی:

بطری ۴ و ۲۰ لیتری

شماره پروانه سازمان دامپزشکی کشور:

### محل و نحوه مصرف

محل مصرف	رقت مصرفی	روش تهیه محلول رقیق	روش استفاده
ضد عفونی تخم مرغ ها (پیش از انتقال به هچری)	۱:۱۰۰۰	۲۵۰ سی سی در ۲۵۰ لیتر آب	غوطه ور سازی
ضد عفونی سیستم های شیردوشی، خطوط انتقال و مخازن نگهداری و محمل شیر	۱:۲۰۰	۲۵۰ سی سی در ۵۰ لیتر آب	گردش در داخل سیستم
ضد عفونی سالن های جوجه کشی و دستگاه های جوجه کشی، سالن های مرغداری و قفس ها و لوازم مرغداری	۱:۲۰۰	۲۵۰ سی سی در ۵۰ لیتر آب	اسپری
جهت استفاده در حوضچه های ورودی و ضد عفونی کامیون ها	۱:۲۰۰	۲۵۰ سی سی در ۵۰ لیتر آب	غوطه ور سازی
در زمان شیوع بیماری های مسری و موارد اپیدمی جهت ضد عفونی کردن	۱:۱۰۰	۲۵۰ سی سی در ۲۵ لیتر آب	اسپری
ضد عفونی جایگاه نگهداری دام، زایشگاه، گوساله دانی ها و بیمارستان	۱:۱۰۰	۲۵۰ سی سی در ۲۵ لیتر آب	اسپری

### روش مصرف در مزارع آبزیان

محل مصرف	رقت مصرفی	روش استفاده
ضد عفونی آب	۱۰۰ سی سی در هر ۱۰۰۰ لیتر	به مدت ۱ ساعت
برای بیماری های انگلی، قارچی و باکتریایی آبزیان در آلودگی خفیف	۵۰ ppm	به مدت ۱۰ دقیقه
برای بیماری های انگلی، قارچی و باکتریایی آبزیان در آلودگی شدید	۶۰ ppm	به مدت ۲۰ دقیقه

محلول ضد عفونی کننده

# بنز الکوئیوم کلراید ۲۰%

آنتی باکتریال وسیع الطیف موثر بر ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها



دفتر مرکزی:

تهران - خیابان فتحی شقاقی - تقاطع یوسف آباد - پلاک ۱۹ - واحد ۱۴  
تلفن: ۸۸۷۰۴۵۶۷، ۸۸۱۰۶۳۱۱  
فکس: ۸۸۷۰۴۵۶۷

کارخانه:

استان زنجان - شهرستان خرمدره، شهرک صنعتی خرمدره

[www.kimiapharmame.ir](http://www.kimiapharmame.ir)  
[info@kimiapharmame.ir](mailto:info@kimiapharmame.ir)

