

محلول ضد عفونی کننده

آرکیل ۲۰

آنتی باکتریال وسیع الطیف موثر بر ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها



تهران - خیابان فتحی شقاقی - تقاطع یوسف آباد - پلاک ۱۹ واحد ۱۴

استان زنجان - شهرستان خرمدره - شهرک صنعتی خرمدره

info@kimiapharmame.ir

www.kimiapharmame.ir

۰۲۱-۸۸۷۰۴۵۶۷

۰۲۱-۸۸۱۰۶۳۱۱

۰۹۱۲-۵۷۲۸۳۳۲

۰۲۱-۸۸۵۵۴۱۱۳

داروسازی کیمیا سلامت خاورمیانه

آرکلیل ۲۰

آنتی باکتریال وسیع الطیف موثر بر ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها

دسته دارویی:

ترکیبات چهارتایی آمونیوم

ترکیب:

۲۰۰ میلی لیتر بنزالکونیوم کلراید در هر لیتر از محلول

مکانیسم اثر:

بنزالکونیوم کلراید با تاثیر بر دیواره سلولی باعث انعقاد سیتوپلاسم می گردد و از فعالیت بعضی از آنزیم های حیاتی میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند. یون کلر موجود در آن باعث شکسته شدن اتصال بین زنجیره های DNA و RNA موجود در ویروس ها می شود.

موارد مصرف:

- ضد عفونی تخم مرغ پیش از انتقال به هچری
- در کارخانه های جوجه کشی برای ضد عفونی هچری ها
- ضد عفونی سالن های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری
- ضد عفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و عبور دام در مزارع پرورش دام و طیور
- ضد عفونی حوضچه های ورودی سالن های مرغداری
- ضد عفونی جایگاه نگهداری دام ها، زایشگاه، گوساله دانی و بیمارستان
- مبارزه با بیماری های عفونی در مزارع پرورش ماهی
- ضد عفونی کامیون های حمل و نقل

- ضد عفونی کفپوش، چکمه ها و ...

مقدار و روش مصرف:

- به نسبت ۱ به ۲۰۰ جهت ضد عفونی سالن ها و تجهیزات مرغداری، حوضچه های ورودی، وسایل حمل و نقل و ...

- به نسبت ۱ به ۱۰۰۰ برای ضد عفونی تخم مرغ و هچری

موارد احتیاط:

- هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید.
- از تنفس بخارات و اسپری محصول پرهیز نمایید.
- آشامیدن محلول بنزالکونیوم خطرناک است و در صورت تماس با پوست سوزاننده و ایجاد حساسیت می نماید.
- در صورت تماس با چشم ها، با آب شستشو و به پزشک مراجعه نمایید.
- فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمایید.
- به دور از منابع آب و غذای دام ها نگهداری شود.

بسته بندی:

بطری پلی اتیلنی ۴ و ۲۰ لیتری

شماره پروانه سازمان دامپزشکی کشور:

99-215-D.T

محل و نحوه مصرف			
روش استفاده	روش تهیه محلول رقیق	رقت مصرفی	محل مصرف
غوطه وری سازی	۲۵۰ سی سی در ۲۵۰ لیتر آب	۱:۱۰۰۰	ضد عفونی تخم مرغ ها (پیش از انتقال به هچری)
گردش در داخل سیستم	۲۵۰ سی سی در ۵۰ لیتر آب	۱:۲۰۰	ضد عفونی سیستم های شیردوشی، خطوط انتقال و مخازن نگهداری و حمل شیر
اسپری	۲۵۰ سی سی در ۵۰ لیتر آب	۱:۲۰۰	ضد عفونی سالن های جوجه کشی و دستگاه های جوجه کشی، سالن های مرغداری و قفس ها و لوازم مرغداری
غوطه وری سازی	۲۵۰ سی سی در ۵۰ لیتر آب	۱:۲۰۰	جهت استفاده در حوضچه های ورودی و ضد عفونی کامیون ها
اسپری	۲۵۰ سی سی در ۲۵ لیتر آب	۱:۱۰۰	در زمان شیوع بیماری های مسری و موارد اپیدمی جهت ضد عفونی کردن
اسپری	۲۵۰ سی سی در ۲۵ لیتر آب	۱:۱۰۰	ضد عفونی جایگاه نگهداری دام، زایشگاه، گوساله دانی ها و بیمارستان

روش مصرف در مزارع آبزیان		
روش استفاده	رقت مصرفی	محل مصرف
به مدت ۱ ساعت	۱۰۰ سی سی در هر ۱۰۰۰ لیتر	ضد عفونی آب
به مدت ۱۰ دقیقه	۵۰ ppm	برای بیماری های انگلی، قارچی و باکتریایی آبزیان در آلودگی خفیف
به مدت ۲۰ دقیقه	۶۰ ppm	برای بیماری های انگلی، قارچی و باکتریایی آبزیان در آلودگی شدید

